

KRŪMMELLEŅU STĀDĪŠANA


Stādījumu izvieto saulainā, siltā, aizvēja pusē. Ļoti ieteicams norobežot no zaķiem un stirnām ar stieplu pinuma žogu.

1. Sagatavo bedri (50x50x50 cm) augsnes iepildīšanai. Bedrei jābūt tik dziļai, lai nodrošinātu lieko virsūdeņu drenāžu.



2. Sagatavo un iepilda bedrē ar kaudzīti stādīšanai paredzēto augsni. Augsnes sastāvs : 1/3 daļa skābā kūdra, 1/3 daļa 2-3 gadu vecas zāģu skaidas un 1/3 daļa skāba smilts. Vienmērīgi sajaucot, pievieno aptuveni 0.6 kg kaļķakmens un dolomītu miltus attiecībā 2:1. Augsnei jānodrošina optimālā PH 4.5-5.5 un gaisa pievadīšana saknēm.

3. Iestāda uzkalnītē un apgriež zara galus un liekos zarus (sk. zīm.). Pirmajā gadā neļauj krūmam ziedēt, lai spēcīgāk iesakņotos. Stāda 90-100 cm attālumā krūmu no krūma. Ieteicams stādīt divu vai trīsgadīgus stādus.



Krūma apgriešana (A) un veidošana (B) nākamajos gados.

Ģimenei (5-7 cilv.) ietecams 25-30 dažādu šķirņu augu. Ogas ienākas pakāpeniski no augusta vidus līdz septembra beigām.

Barības elementu deficīts un pārbagātība krūmmellenēm

Krūmmellenēm ir ļoti atšķirīgas prasības pēc augsnes īpašībām un mēslojuma, salīdzinot ar citām ogu kultūrām. Precīzai mēslošanai ir nepieciešams izdarīt lapu un augsnes analīzes. Augsnes analīze ir ļoti svarīga pirms plantācijas ierīkošanas. Galvenā nozīme ir augsnes aktīvajai reakcijai - pH/KCl, humusa saturam, makro un mikroelementu daudzumam. Sevišķi svarīgi ir pārbaudīt mangāna saturu. Tā pārbagātība augsne pēc paskābināšanas var izsaukt toksisku iedarbību uz stādiem un to bojāeju. Jo mangāna saturs augsne pārsniedz 30 mg litrā, tad nav veļams stādīt krūmmellenes.

Pēc plantācijas ierīkošanas sevišķi nozīmīgi ir pastāvīgi kontrolēt augsnes pH/KCl. ASV un Kanādā augsni analizē līdz 3 reizēm gadā - agri pavasarī tūlīt pēc tās atkuššanas, jūnijā pēc lapu izplaukšanas un jūlija beigās vai augusta sākumā. Peldējās divās reizēs vienlaicīgi ar augsnes analīzi nosaka arī barības elementu saturu lapās. Jūnijā noņem lapu paraugu no iepriekšējā gada dzinumiem, bet jūlija beigās vai augusta sākumā lapas ņem no pašreizējā gada dzinumiem. Lapām ir jābūt beigušām augt un sasniegušām normālus izmērus.